

宮崎牛

8

Miyazaki Gyu

2026

No.101

<http://www.miyazakiken-chikusan.jp/>



UAEで宮崎牛レセプション開催！

Contents

第77回宮崎県学校農業クラブ連盟大会「家畜審査競技会」	From 全和県支部	1
アラブ首長国連邦(UAE)において宮崎牛レセプションを開催しました！	From 宮崎県	3
第98回アカデミー賞アフターパーティーでの宮崎牛の提供について	From JAみやざき	4
暑熱対策・獣害対策について	From 宮崎県	5
JAみやざき和牛枝肉共進会を開催	From JAみやざき	7
「第11回宮崎県モーモーマーちゃんの集い」開催について	From 畜産協会	8
堆肥づくりマニュアル	From 畜産協会	9
新規種雄牛紹介	From 事業団	10
種雄牛現場後代検定枝肉成績判明	From 事業団	11
Jリーグアウォーズ最優秀育成クラブに宮崎牛を贈呈しました！	From JAみやざき	12
供用種雄牛の体型測定値と改良期待点及び交配注意点	From 事業団	13

第77回宮崎県学校農業クラブ連盟大会 『家畜審査競技会』 畜産を学ぶ高校生 仲間とともに 審査眼を競う!



第77回宮崎県学校農業クラブ連盟大会（事務局：高鍋農業高等学校）の、『家畜審査競技会』が、去る令和8年6月12日に児湯地域家畜市場で開催されました。

県内から都城農業高等学校、小林秀峰高等学校、高鍋農業高等学校、高千穂高等学校の4校から黒毛和種の部に43名、ホルスタイン種の部に23名がエントリーし、それぞれ4頭の牛について審査を行い、これまで培ってきた審査技術の成果を競いました。このうち黒毛和種の部では審査競技の設問は、4頭について、黒毛和種種牛審査標準に照らした牛の相対的な評価の序列と、中軀、後軀、資質の3項目の序列について出題されました。選手の皆さんは一度離れた位置から4頭の牛を確認してから、1頭1頭様々な角度から何度も見比べたり、尻の形（骨の位置）を手で確認する人や、皮膚のゆとり、毛の感触を確かめたりしながら審査に取り組む様子が見られました。



競技の結果、黒毛和種の部は、都城農業高等学校3年の内村 健太郎さんが、ホルスタイン種の部は、都城農業高等学校3年の上池 妃依さんが第1位に輝きました。

閉会行事においては、宮崎県学校農業クラブ会長の高鍋農業高等学校園芸科学科3年 柴田悠希さんから、運営にご尽力いただいた関係者の皆さん、協力していただいた生産者の方々への感謝とお礼の言葉が述べられるとともに、参加された選手に向けて、『皆さんが日ごろの学習や実習で培った知識と技術を発揮し真剣に競技に取り組む姿が印象的であり、今日学び感じたことをそれぞれの学校での学習やこれからの農業クラブ活動に活かし、地域の農業を担う私たち自身がさらに知識と技術を高めていけるようこれからも努力を積み重ねていきましょう』と挨拶がありました。

家畜審査競技会を振り返り、担当校の高鍋農業高等学校の生徒たちの会場設営や競技会運営はもとより、牛の引き手として頑張っている姿が印象的であり、生徒が主体となって取り組んでいる様子が伝わってきました。また、引き手を務めた高鍋農業高等学校の生徒たちは、今日初めて対面する供試牛を少しでも良く見せようと牛に声をかけながら一生懸命に立てていました。

愛牛を提供いただいた農家の方々やご指導いただいた先生や各関係者が一体となった素晴らしい競技会でした。

日頃の実習や農業クラブ活動を通して得た体験や知識を活かし、今後は日本の農業を支える後継者として大きく飛躍されることを熱望いたします。



【黒毛和種の部】

2位 犬童 煌人 さん (小林秀峰高等学校) 1位 内村 健太郎 さん (都城農業高等学校) 3位 山田 大斗 さん (小林秀峰高等学校)

アラブ首長国連邦 (UAE) において 宮崎牛レセプションを開催しました!

UAEにおける宮崎牛レセプション

県産牛肉のイスラム圏における輸出拡大に向けて、県内で初めてハラール認証を取得した株式会社SEミート宮崎（以下、「SEミート」）からアラブ首長国連邦（UAE）向けの輸出解禁を見込み、1月23日（現地時間）にドバイ市内のホテルにおいて現地のバイヤーや飲食店関係者などを招へいた約100名規模の宮崎牛レセプションを開催しました。

レセプションでは、最初に宮崎牛の特長や全国和牛能力共進会での実績、SEミートの最新鋭施設を紹介するセミナーを実施した後、宮崎牛を使ったカッティングデモンストレーションを行い、普及していないランプ・イチボのカット方法や調理の仕方を現地のシェフなどにレクチャーしました。

併せて、宮崎牛のサーロイン、リブロースといった現地で需要の高い高級部位を使った料理を4品提供し、世界に誇る宮崎牛のほのかな甘みと豊潤な香りを堪能していただきました。



日隈副知事の挨拶



JAみやざき 坂下副組合長の挨拶



商談の様子



会場の様子



試食する参加者



カッティングデモンストレーションの様子

現地のシェフのコメント

- ・宮崎牛は、これまで食べてきたどの和牛と比べても舌ざわりが良い。今後の活用を検討したい。
- ・宮崎牛は、脂が甘すぎず固すぎず、口の中ですり切れ、大変バランスが良いと感じた。



提供料理①



提供料理②

まとめ

今回のレセプションは、宮崎牛のイスラム圏における更なる商流構築につながる非常に意義のあるイベントとなりました。引き続き、関係機関と一体となって宮崎牛のプロモーションを実施し、UAEをはじめとしたイスラム圏での宮崎牛の認知度向上や販路開拓を促進してまいります。



第98回アカデミー賞アフターパーティーへの 宮崎牛の提供について

2026年3月に開催された「第98回アカデミー賞アフターパーティー」において宮崎牛の提供を行いました。2018年から通算8度目の採用となり、アカデミー賞公式のアフターパーティー「ガバナーズボール」のメニューとして世界中の映画関係者やハリウッドスターに提供されています。

料理を担当したのは、アカデミー賞公式シェフとして知られる世界的有名シェフであるウルフギャング・パック氏です。今年も宮崎牛を使用したオリジナルメニューが提供され、多くの来場者から高い評価を受けました。また、昨年11月にはウルフギャング・パック氏のチームの皆様が宮崎県を訪問され、生産者との意見交換や牛舎視察、JAみやざき及び宮崎県庁への表敬訪問、(株)ミヤチクの工場視察等を行い、宮崎牛の魅力について理解を深めていただきました。

ウルフギャング・パック氏は、アカデミー賞アフターパーティーでのメニューに宮崎牛を使い続ける理由を「宮崎牛は最高で、私たちが宮崎牛を大好きだから」と語られました。今後も世界に誇る最高峰の宮崎牛を国内外へ広く発信していきたいと思います。



アフターパーティーの厨房での写真
ウルフギャング・パック氏(左から2番目)

©Sakura Production USA

畜舎環境を整えて、生産性を高めましょう ～暑熱対策と野生動物侵入防止対策～

1 はじめに

牛は暑さにとても弱い動物で、高温多湿な日本の夏はストレスの多い環境です。牛が快適に過ごせる気温（至適温度*1）は、**繁殖牛→10～20℃、子牛→13～25℃、肥育牛→15～25℃**といわれています。

*1 至適温度は湿度や気流などの影響を受けます。

また、牛舎の環境を整える上で、暑熱対策と併せて見落とせないのが衛生管理です。近年問題になっているのが畜舎内への野生動物の侵入です。牛舎内への野生動物（タヌキ、アナグマなど）の侵入は、疾病の感染リスクを高めるだけでなく、飼料の食害や施設の破損など大きな被害を招きます。事前に対策を行い、防疫力の高い牛舎環境作りに努めましょう。

2 暑熱対策について

暑熱ストレスによる悪影響は、乾物摂取量の低下に起因する生産性の低下（増体重、繁殖成績の悪化）、免疫力の低下（疾病発生リスクの増大）、疾病の重症化による廃用・死亡リスクの増加などがあげられます。

① 日常の管理体制（見守りの強化）

温湿度計を設置し、THI（温湿度指数）を意識した管理を行いましょう（図1）。THI（温湿度指数）は、温度と湿度を組み合わせた指標で、牛や人の暑熱ストレスを評価するために使用されます。

牛の観察のポイントとしては、呼吸数・開口呼吸の有無（ハアハアと荒い息をしていないか）、体温上昇の兆候（活動量の低下、日陰から動かないなど）を確認しましょう。

② 物理的環境改善（環境・牛体温度を下げる）

換気扇の清掃と適切な風量配置を確認し、扇風機で牛体に直接風を当て気化熱を奪うなど送風と換気を徹底します。併せて屋根への遮熱塗料の塗布や、遮光ネットの設置、屋根・畜舎周囲への散水による放射熱の抑制により遮熱します。また、細霧（ミスト）システム等の活用（送風との併用が効果的）（写真①）、冷水給与（写真②）、ネッククーラーの装着（写真③）など複数の対策を組み合わせる取り組みましょう。

（図1） THI（温湿度指数）早見表（牛）

		湿度 (%)											
		35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
温度 (°C)	20	64	65	65	65	65	66	66	66	67	67	67	67
	21	66	66	66	67	67	67	67	68	68	68	69	69
	22	67	67	67	68	68	69	69	69	70	70	70	71
	23	68	68	69	69	70	70	70	71	71	72	72	73
	24	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74
	25	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76
	26	71	72	72	73	74	74	75	75	76	76	77	78
	27	72	73	74	74	75	76	76	77	77	78	79	79
	28	74	74	75	76	76	77	78	78	79	80	80	81
	29	75	75	76	77	78	78	79	80	81	81	82	83
	30	76	77	77	78	79	80	81	81	82	83	84	84
	31	77	78	79	80	80	81	82	83	84	84	85	86
	32	78	79	80	81	82	83	83	84	85	86	87	88
	33	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	34	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	35	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93

THI = (0.8 × 気温 + (相対湿度 / 100) × (気温 - 14.4)) + 46.4

例えば、気温が22℃で人間は涼しく感じてても、湿度が75%以上ある場合、「注意」する必要があります。

THI	危険度	色
65-69	要注意	黄色
70-74	注意	山吹色
75-79	警告	橙色
80以上	危険	赤色



③ 栄養管理（採食量を維持する）

水槽の清掃と、十分な水圧・水量の確保（水温が上がらないよう配管の断熱も有効）、涼しい時間帯（早朝や夕方）の給餌頻度を高める、飼料の鮮度維持（サイレージの発酵・カビを防ぐため、一度に出す量を減らす）、発汗で失われるカリウム、ナトリウム等の補給（重曹入り鉱塩の給与）などにより採食量の維持に努めましょう。

3 野生動物侵入防止対策について

ここでは、平野部でも多く見られる野生動物（中型獣類）の対応について記載します。侵入防止対策には、単一の方法ではなく、「寄せ付けない（環境整備）」、「侵入させない（物理的障壁）」、「疾病リスクの対応」の3段階を組み合わせた総合的な管理が重要です。

ステップ1：エサ場にさせない（畜舎内の整理整頓）

飼料管理：飼料袋の密閉保管（ペール容器の利用など）、こぼれた飼料はすぐに清掃するなど畜舎内を整理整頓。

残渣処理：胎盤や死体、堆肥の適切な処理（野生動物を誘引する臭いを遮断）。

アナグマ



タヌキ
* 疥癬（皮膚病）
を発症している

ステップ2：隠れ場所をなくす（環境整備）

草刈り：牛舎周囲の雑草を刈り取り、見通しを確保（潜伏場所の排除）（写真④）。

資材整理：放置された機械や資材を片付け、野生動物の通り道を遮断。



④周囲の除草事例

ステップ3：物理的にシャットアウトする

防護柵の設置：電気柵もしくは複合柵（楽落くん方式）を設置し、牛舎への侵入を防止（写真⑤）。

(図2)



*「楽落（らくらく）くん方式」(図2)は中型動物の飛び越え能力と探査行動を利用したネットと電気柵を組み合わせた高さ約40cmの上部に電気柵線を設置する複合柵。高い位置に通電部分があるので草による漏電のリスクは軽減され、移動も楽なのでピンポイントで使えるのも利点。



⑤圃場での設置事例

ステップ4：疾病リスクの対応

野生動物は寄生虫や菌、ウイルスなどを媒介し、様々な疾病を牛舎内に持ち込む可能性が高く、家畜への感染リスクが高まります。野生動物の糞尿や毛などのほか、水槽の水を介して感染するリスクがあります。

開放型水槽のこまめな清掃と野生動物が接触しない給水システムの検討、侵入痕跡（足跡、糞、毛）を見つけたらすぐに清掃と消毒を行い、もし牛に異変（下痢、流産、食欲不振等）があれば、獣医師へ相談しましょう。

野生動物による被害対策のご相談は、西臼杵支庁・各農林振興局もしくは鳥獣被害対策支援センターへご連絡ください。



牛舎の消毒事例（煙霧）

4 最後に

牛舎環境の整備は、野生動物侵入防止の対策のみならず、生産性向上としても重要です。牛舎周りの整理や草刈り、内部の清掃などを定期的に行い、牛の飼養管理を行いやすい衛生的な環境を整えましょう。

JAみやざき和牛枝肉共進会を開催



岩下盛明さん（息子の順一さん左から4番目）贈呈後の様子

令和8年6月23日（火）、（株）ミヤチク高崎工場において、JAみやざき和牛枝肉共進会が開催され、県内より選抜された105頭が出品されました。肉質は、最高の5等級が



全体の99.0%、出品されたすべての牛が4等級以上で、上物率100%とレベルの高さを示しました。その中において、岩下盛明さん（こばやし地区本部）の出品牛がグランドチャンピオン賞に輝きました。

グランドチャンピオン牛は、その後のセリで宮崎牛指定店の大淀河畔みやちくが1キロあたり8,100円で競り落としました。

岩下さんは、「家族みんなで一生懸命、飼養管理に取り組んだ成果が実った。JA、行政の技術員、部会の仲間などが支えてくれたおかげ。これからも牛飼いを続けられるように、家族仲良く頑張りたい」と話されました。

グランドチャンピオンに輝いた枝肉

上位入賞者成績

地区本部名	出荷者名	性別	血統			着体重	枝肉重量	枝肉歩留	歩留等級				BMS No.	等級	単価	入賞
			父	母の父	母の祖父				ロース芯	バラ厚	皮下脂肪	推定歩留				
こばやし	岩下 盛明	去	桃白鵬	満天白清	忠富士	825	553.4	68.0	84	10.8	2.3	78.5	12	A5	8,100	グランドチャンピオン賞
こばやし	株式会社倉園牧場	去	美津秋	耕富士	美穂国	837	555.4	68.3	110	10.4	2.6	81.4	12	A5	5,030	優秀賞1席
都城	釘田 博明	去	桃白鵬	秀菊安	美穂国	884	579.6	65.6	94	11.2	2.7	79.5	12	A5	4,720	優秀賞2席
こばやし	有限会社馬場牧場	去	宗守富士	美穂国	勝平正	869	559.3	66.2	87	10.4	2.3	78.6	12	A5	4,510	優秀賞3席
都城	有限会社薬師畜産	雌	英白清	福晴茂	勝平正	722	469.0	66.3	93	9.9	2.5	79.9	12	A5	4,370	優良賞1席
児湯	澤田 公一	去	桃白鵬	満天白清	秀菊安	872	566.0	65.6	109	11.4	2.4	81.9	12	A5	4,120	優良賞2席
—	(株)内田畜産 夏尾クイーンズ	雌	清正秀	富久竜	秀菊安	850	557.3	66.5	103	11.8	2.4	81.6	12	A5	4,050	優良賞3席
はまゆう	株式会社外山畜産	去	満天白清	耕富士	美穂国	889	587.4	66.5	79	10.7	2.5	77.2	11	A5	4,540	特別賞（脂質賞）
JAみやざき和牛枝肉共進会平均						833.0	541.9	66.1	86.9	10.2	2.3	78.6	11.6		3,118	

「第11回宮崎県モーモーマーちゃんの集い」 開催について

牛飼い女性のための研修・交流会を、今年は都城市で開催します！
ぜひ近所の畜産仲間を誘って御参加ください。

日 時：令和8年11月30日(月) 10時～14時予定

場 所：ウエルネス交流プラザ1階

茶霧茶霧ギャラリー（都城市蔵原町11-25）

内 容：講演（日本全薬工業株式会社 後藤篤志先生）、
意見交換、一分間スピーチ等


その他：詳細は10月に改めて宮崎県畜産協会HP等にてご案内いたします。

問合せ：（公社）宮崎県畜産協会 宮地・高橋（TEL：0985-41-9302）



畜産協会 HP

令和7年度：第10回宮崎県モーモーマーちゃんの集いの様子（令和7年8月27日 高千穂町自然休養村管理センター）




消費者への畜産物 PR 活動について

公益社団法人中央畜産会では、今年度も地方競馬全国協会の補助を受けて、畜産物消費拡大の理解醸成を図る取組を実施します。

全国の新聞、テレビ、交通機関及び各種の機関紙等での広告掲載や、各種イベントでのPR資材配布等のPR活動が実施されますので、お知らせします。

～堆肥づくりマニュアル～

畜産業において家畜排せつ物の管理は大変重要です。「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づき、適切な堆肥処理に努めましょう。



新規種雄牛紹介

田尻系

えいほうのうみ
栄宝之海

- 美点／骨味、輪郭鮮明、乳頭の大きさ、乳頭間隔、体上線、皮膚
- 惜点／肩後、肘後、背幅、尻の形、腿、やや長脚

生年月日／令和6年9月3日

産地／高千穂町 生産者／甲斐 武重氏

測尺値（21.2ヵ月）（発育評価+0.6σ）

体高／139.8cm

体長／159.4cm

胸囲／190cm

体重／533kg

神照栄	秀菊安	安平 きくの233	安福(宮崎) 隆美
	ふじこ	忠富士 ななこ	平茂勝 安平
うみ	秀正実	第1花国	北国7の8
		やまひめ1	福桜(宮崎)
	ひまわり	秀菊安 くろみほさかえ	安平 美穂国

試験交配	令和8年4月
後代検定開始予定	令和9年10月
後代検定結果判明予定	令和11年6月

気高系

ももりゅうせい
桃龍星

- 美点／輪郭鮮明、骨味、体上線、肩付、腹容、乳頭間隔、毛の密度、体深
- 惜点／肘後、前胸、胸底、上肋、頭頸、やや乳頭の大きさ

生年月日／令和6年9月12日

産地／都城市 生産者／東 美智子氏

測尺値（20.9ヵ月）（発育評価+0.5σ）

体高／139.4cm

体長／163.4cm

胸囲／194cm

体重／544kg

桃白鵬	白鵬85の3	勝忠平 みどり	平茂勝 白清85の3
	ももえり	秀菊良 うめかず5	安平 福之国
うめあこ	耕富士	忠富士 あいか	平茂勝 福之国
		美穂国 ちよひめ	糸北国 美津照
	うめちよ		

試験交配	令和8年5月
後代検定開始予定	令和9年11月
後代検定結果判明予定	令和11年7月

田尻系

けいじろう
啓次郎

- 美点／発育、腹容、肢勢、皮膚、毛味、乳頭間隔、骨味
- 惜点／肩端、上肋の張り、やや毛色

生年月日／令和7年1月6日

産地／宮崎市 生産者／十河 啓二氏

測尺値（17.3ヵ月）（発育評価+0.7σ）

体高／136.0cm

体長／156.0cm

胸囲／187cm

体重／503kg

清正秀	秀菊安	安平 きくの233	安福(宮崎) 隆美
	みさこ	安福久 みさと	安福165の9 勝忠平
なほ	第5安栄	忠富士 やすさかえの5	平茂勝 福之国
		勝平正 はるやす	平茂勝 北平安
	なおみ		

試験交配	令和8年6月
後代検定開始予定	令和9年12月
後代検定結果判明予定	令和11年8月

種雄牛現場後代検定枝肉成績判明

気高系

桃百合 黒原6531 (84.6)



生年月日/令和3年4月30日
産地/都城市
生産者/坂下 浩二 氏

測尺値 (51.2 ヲ月)
体高/151.6cm
体長/182.6cm
胸囲/212cm
体重/758kg

耕富士	忠富士	平茂勝	第20平茂
		みふく2の4	安平
ももゆり	あいか	福之国	北国7の8
		きよみ	安平
	百合白清2	百合茂	平茂勝
		みどり	白清85の3
	ももえり	秀菊良	安平
		うめかず5	福之国

●改良期待点/発育、体積、尻幅、腹容、骨味 ●交配注意点/上肋の張り、肩後、肘後

現場後代検定成績 (R8.1.16 判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢11頭	526.4kg	73.4cm ²	8.9cm	2.2cm	76.3%	10.6	100%

桃百合×満天白清×耕富士 (BMS No.12)



桃百合×宗守富士×秀正実 (BMS No.12)



桃百合×耕富士×秀正実 (BMS No.12)



気高系

松五郎 黒15906 (82.3)



生年月日/令和3年5月20日
産地/串間市
生産者/坂藤 政文 氏

測尺値 (50.6 ヲ月)
体高/147.2cm
体長/177.2cm
胸囲/209cm
体重/720kg

白鵬85の3	勝忠平	平茂勝	第20平茂
		うめ2	忠福
	みどり	白清85の3	飛驒白清
		みすず	平茂勝
まつ9の2	秀菊安	安平	安福(宮崎)
		きくの233	隆美
	まつ9	忠富士	平茂勝
		まつ	安平

●改良期待点/体上線、皮膚、骨味、乳頭間隔 ●交配注意点/肢勢、肩後、下膝部

現場後代検定成績 (R8.2.5 判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢12頭	478.2kg	72.9cm ²	9.4cm	1.9cm	77.5%	11.4	100%

松五郎×耕富士×勝平正 (BMS No.12)



松五郎×耕富士×勝平正 (BMS No.12)



松五郎×義美福×勝平正 (BMS No.12)



田尻系 ^{みつ かつ しげ} 満勝茂 黒原6553 (83.5)



生年月日/令和3年6月26日
産 地/小林市
生 産 者/脇屋敷 まさ子 氏

測尺値 (48.2 ヲ月)
体 高/152.8cm
体 長/178.0cm
胸 囲/205cm
体 重/650kg

満天白清	安平	安福(宮崎)	田安土井
		きよふく	安福(岐阜)
	ゆきのはな	白清85の3	飛驒白清
ももえ		ゆき	福桜(宮崎)
	勝平正	平茂勝	第20平茂
		やすみ	安平
	ももかつ	糸茂勝	茂勝
		ももこ	福桜(宮崎)

●改良期待点/腰幅、腹容、資質、骨味、顔品、後肢 ●交配注意点/肩後、肘後、外腿

現場後代検定成績 (R8.3.12判明)	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準	BMS	上物率(A-4, 5)
	去勢11頭	527.0kg	78.0cm ²	9.1cm	1.8cm	77.4%	11.1	100%



Jリーグアウォーズ最優秀育成クラブの「FC東京」に宮崎牛を贈呈しました！

Jリーグの2025シーズンでアカデミーから輩出したプロ契約選手の人数とその育成期間、また当該選手の公式戦出場実績において、最も高い実績を上げたクラブが選出される「最優秀育成クラブ賞」。その栄冠に輝いた「FC東京」へ「宮崎牛50kg」と「完熟きんかんたまたま」の贈呈を行いました。「FC東京」は3年連続の受賞となりました。



贈呈式では、より良き宮崎牛づくり対策協議会より激励の言葉を述べ、今後の活躍を祈願するとともに「世界に誇る最高峰の宮崎牛・完熟きんかんたまたま」として宮崎県産品のPRを行いました。「FC東京」の2026シーズンにおける活躍も期待します。

FC東京へ贈呈

供用種雄牛の体型測定値と改良期待点および交配注意点

系統	種雄牛名	生年月日	登録番号	登録点数	父	母の父	母の母の父	生産地	測尺時年齢
糸桜系	照日向	H28.11.15	黒 15410	82.3	奥日向	福桜	日向国	高千穂町	6歳5か月
	高城栄	R2.7.15	黒原 6446	83.6	秀正実	秀菊安	美穂国	高千穂町	4歳9か月
	奥菊重	R3.4.15	黒原 6529	83.0	奥日向	奥日向	忠富士	五ヶ瀬町	4歳3か月
	日向灘	R3.8.26	黒原 6554	84.5	奥日向	忠富士	安平	高千穂町	4歳
	福龍星	R5.8.2	黒 16116	82.6	秀俊実	耕富士	美穂国	都城市	2歳1か月
	秀幸久	R6.1.17	黒原 6705	83.7	光園久	秀正実	天奨藤	えびの市	1歳6か月
	大福茂	R6.2.18	黒 16211	82.2	照日向	秀菊安	芳山土井	高千穂町	1歳6か月
気高系	耕富士	H22.3.9	黒原 5400	83.7	忠富士	福之国	安平	日南市	15歳4か月
	勝美利	H26.11.23	黒原 5994	83.3	勝平正	福之国	安平	延岡市	10歳5か月
	白隆鵬	H29.3.22	黒 15467	82.8	白鵬85の3	百合茂	安福久	都農町	4歳
	桃白鵬	H29.6.16	黒原 6214	84.2	白鵬85の3	秀菊良	福之国	都城市	8歳1か月
	英白清	H29.6.17	黒 15468	83.0	百合白清2	忠富士	安平	高千穂町	8歳2か月
	羅旺45	H30.1.24	黒 15533	83.2	白鵬85の3	秀菊安	忠富士	串間市	6歳6か月
	孔明桜	H31.2.23	黒原 6326	83.1	耕富士	美津照重	福桜(宮崎)	都城市	5歳3か月
	満登志	R1.7.5	黒 15677	82.8	百合白清2	秀菊安	安平	日向市	5歳
	福之福	R2.11.11	黒 15820	82.9	福桜(宮崎)	安重守	福桜(宮崎)	国富町	4歳
	桃百合	R3.4.30	黒原 6531	84.6	耕富士	百合白清2	秀菊良	都城市	4歳3か月
	松五郎	R3.5.20	黒 15906	82.3	白鵬85の3	秀菊安	忠富士	串間市	4歳2か月
	利紀勝	R3.8.6	黒 15938	84.0	勝美利	洋紀久	平忠勝	小林市	4歳1か月
	第5安誉	R3.12.25	黒 15959	82.7	第5安栄	丸宮照	白清85の3	宮崎市	3歳7か月
	菊百合友	R4.2.6	黒原 6585	84.0	百合白清2	秀菊安	美穂国	えびの市	3歳5か月
	梅百合	R4.4.21	黒原 6586	84.1	梅華国	百合白清2	秀菊良	都城市	3歳3か月
	百華千尋	R4.10.10	黒原 6631	83.2	梅華国	秀菊安	梅福6	日向市	2歳8か月
	福華栄	R5.4.19	黒 16101	82.7	第5安栄	美津照重	福之国	国富町	2歳3か月
	増福宮	R5.8.22	黒 16117	82.7	白鵬85の3	忠富士	福之国	宮崎市	2歳
	充利富士	R5.12.1	黒原 6696	83.3	耕富士	白鵬85の3	福之国	えびの市	1歳8か月
	七琉久	R6.1.2	黒原 6704	85.4	羅旺45	耕富士	福之国	日南市	1歳7か月
	英白勝	R6.3.16	黒原 6731	84.1	英白清	富久電	勝平正	宮崎市	1歳5か月
	桃龍星	R6.9.12	黒原 6755	83.5	桃白鵬	耕富士	美穂国	都城市	1歳1か月
	永瑛桜	R6.11.21	黒原 7008	83.7	第5安栄	秀正実	百合茂	川南町	1歳6か月
	天宮美利	R7.1.8			勝美利	満天白清	忠富士	延岡市	1歳5か月
	倅白鵬	R7.5.4			倅白清	秀菊安	白鵬85の3	綾町	1歳1か月
田尻系	満天白清	H25.7.21	黒 15024	81.8	安平	白清85の3	福桜(宮崎)	西都市	11歳1か月
	神照栄	H27.7.8	黒原 6036	83.5	秀菊安	忠富士	安平	高千穂町	9歳1か月
	福晴茂	H27.10.7	黒原 6062	83.7	福安照	平茂晴	平茂勝	新富町	9歳8か月
	美津秋	H28.3.29	黒 15342	81.7	美津照重	福之国	茂福(宮崎)	小林市	9歳2か月
	二刀流	H28.9.6	黒 15391	82.8	美津照重	安福久	勝忠平	宮崎市	5歳
	清正秀	H28.10.3	黒 15392	82.8	秀菊安	安福久	勝忠平	宮崎市	8歳7か月
	美津白鵬	R2.1.12	黒 15736	82.5	美津照重	白鵬85の3	福之国	えびの市	5歳6か月
	守浩桜	R3.3.26	黒原 6530	85.8	宗守富士	耕富士	福桜(宮崎)	小林市	4歳4か月
	満勝茂	R3.6.26	黒原 6553	83.5	満天白清	勝平正	糸茂勝	小林市	4歳
	那央飛龍	R3.7.31	黒原 6555	83.5	満天白清	勝平正	福桜(宮崎)	宮崎市	4歳
	明日忠	R3.10.16	黒 15937	82.9	安秀平	平忠勝	安平	美郷町	3歳8か月
	桃満星	R3.12.20	黒原 6567	84.0	満天白清	秀菊良	福之国	都城市	3歳7か月
	奥照重	R4.1.19	黒原 6566	83.0	美津照重	奥日向	美穂国	五ヶ瀬町	3歳3か月
	満天之星	R4.5.19	黒 15990	82.0	満天白清	美津照重	福桜(宮崎)	都城市	3歳2か月
	富士蜜龍	R4.6.18	黒原 6632	83.0	宗守富士	美津照重	勝平正	都城市	3歳1か月
	梅茂栄	R5.1.20	黒 16102	82.6	神照栄	耕富士	美穂国	高千穂町	2歳6か月
	神龍星	R6.1.18	黒 16212	83.1	宗守富士	秀菊安	忠富士	高千穂町	1歳7か月
	満栄翔	R6.2.28	黒 16213	82.8	満天白清	第5安栄	美穂国	宮崎市	1歳6か月
	美天照	R6.4.11	黒 16223	82.7	美津照重	耕富士	秀菊安	新富町	1歳4か月
	第17輝	R6.5.3	黒原 6733	83.4	神照栄	第5安栄	福之国	宮崎市	1歳2か月
	一美津	R6.6.10	黒原 6732	83.6	美津照重	義美福	忠富士	高原町	1歳1か月
	栄宝之海	R6.9.3	黒 16272	82.6	神照栄	秀正実	秀菊安	高千穂町	1歳1か月
	菊正福	R6.12.10	黒原 7007	84.3	清正秀	義美福	菊広土井	宮崎市	1歳5か月
	啓次郎	R7.1.6	黒原 7009	83.8	清正秀	第5安栄	勝平正	宮崎市	1歳5か月
	嗣芳土井	R7.2.2			奥友博	秀菊安	丸福土井	日南市	1歳4か月
	小代茂	R7.3.21			満天白清	秀菊安	芳山土井	高千穂町	1歳3か月

現在、(一社)宮崎県家畜改良事業団では種雄牛58頭(令和8年6月1日現在)を繋養しております。
種雄牛ごとの体型測定値と体型からみた改良期待点および交配注意点(登録審査時)を示しておりますので、
種雄牛のフレーム、母牛の体型や系統を考慮した適正な交配をお願い致します。

体高 (cm)	発育評価 (σ)	体長 (cm)	胸囲 (cm)	体重 R8.5月 (kg)	改良期待点	交配注意点
149.8	+0.8	175.8	210	682	腹容、内腿、骨味、毛の密度	発育、背幅、肘後、後肢
151.0	+1.1	176.6	211	647	発育、体上線、腰幅、腹容、内腿、骨味、毛質	肘後、後肢、外腿
149.0	+0.7	179.2	204	711	腹容、皮膚、腿、尻幅	肩付、前肢つなぎ、骨太、肘後、肩後
151.0	+1.2	182.8	211	785	発育、体積、体伸、体幅、尻、腿、皮膚、体上線	顔品、肘後、ヤヤ肩後
141.0	+0.2	164.0	201	714	骨味、腹容、皮膚、体深	前軀幅、背幅、乳頭の大きさ、尻の形
136.6	+0.5	157.2	195	668	皮膚、骨味、体深、輪郭鮮明、腹容	尻の形、下腿、上肋の張り、後肢
135.6	+0.3	157.8	189	614	体深、前軀幅、肩付、骨味、乳頭間隔	尻、腿、体上線
151.0	+1.1	177.4	207	680	品位、尻、体上線、皮、骨繋り、顔の大きさ	前軀深、背幅、乳微、肘後、前肢の強さ
150.0	+0.8	174.6	210	691	肩の厚み(前軀)、胸、腹容、毛質	乳微、ヤヤ背幅、肩後、肘後、ヤヤ下膝部
149.4	+0.8	176.0	218	763	資質、腹容、内腿、腰幅	肩付、肩後、肢勢、乳頭
152.6	+1.5	178.4	217	799	体深、肩付、資質、腹容、内腿	後肢、乳頭、肘後、外腿
150.4	+0.9	182.0	217	793	前軀幅、腰幅、資質、骨味	肩端、肘後、外腿、ヤヤ体上線
156.2	+2.3	180.4	216	774	発育、体上線、体伸、毛生密度、骨味	つなぎ、下膝部、ヤヤ肩後、ヤヤ尻の形、ヤヤ肩端
157.4	+2.7	179.0	219	746	体深、尻幅、皮膚、乳頭間隔、腹容、腰幅、骨味	過大、肩端、肘後、ヤヤ前背幅
149.0	+0.6	182.6	212	763	体伸、骨味、乳微、肩付、毛生密度、内腿、毛色	体上線、肩後、前肋の張り、外腿、ヤヤつなぎ
148.4	+0.6	175.4	204	690	骨味、尻幅、皮膚のゆとり、腹容、腰幅、体上線、乳頭の鮮明さ	肩後、肩端、肘後、下膝部
151.6	+1.3	182.6	212	758	発育、体積、尻幅、腹容、骨味	上肋の張り、肩後、肘後
147.2	+0.2	177.2	209	720	体上線、皮膚、骨味、乳頭間隔	肢勢、肩後、下膝部
149.4	+0.8	177.0	210	735	体幅、体深、尻、腿、骨味、皮膚のゆとり、乳頭間隔	後肢、肘後、前上肋の張り
148.6	+0.7	177.0	210	782	腹容、皮膚、骨味、内腿、乳頭間隔	上肩、肩後、肩端、上肋の張り
151.0	+1.4	178.6	220	796	発育、体伸、尻、内腿、肩の厚み、皮膚、乳微	肩端、肋張り、前肢、肘後、ヤヤ体下線
150.2	+1.2	179.0	208	766	体積、体伸、体上線、腹容、尻、内腿、皮膚のゆとり、乳頭の大きさ	緊実性、肩後、上肋、ヤヤ骨太
150.2	+1.5	169.4	205	710	発育、腹容、内腿、骨味、乳頭の大きさ	肩端、肘後、肋張り、肢勢
143.0	+0.3	163.0	197	696	腹容、骨味、皮膚のゆとり、体繋り	前軀、背幅、尻の形、前肢つなぎ
139.6	-0.1	168.0	197	745	腰幅、腿、腹容、毛質、皮膚、乳頭間隔	前軀、肢勢、体伸、乳頭の大きさ
138.0	+0.7	166.0	187	708	発育、体伸、尻幅、毛質、皮膚のゆとり、体上線	肩端、肩後、下腿、下膝部
138.0	+0.7	157.2	192	691	発育、体積、体幅、体深、後望均称、中軀、尻、内腿、毛質、皮膚	肩端、肘後、前肢つなぎ、ヤヤ顔品、乳頭の大きさ
136.0	+0.7	165.0	192	645	発育、体幅、前胸、尻、腹容、毛質	肩後、肘後、前肢つなぎ、外腿、上肋
128.2	+0.4	143.8	172	544	輪郭鮮明、骨味、体上線、肩付、腹容、乳頭間隔、毛の密度、体深	肘後、前胸、胸底、上肋、頭頸、ヤヤ乳頭の大きさ
134.2	-0.1	158.0	186	530	体深、体上線、輪郭鮮明、皮膚、骨味、乳頭、後肢(肘立)	肩端、肘後、前上肋の張り
136.0	+0.8	155.4	185	490	※体上線、毛質、骨味、内腿	肋張り、背幅、肩端、肘後
134.4	+2.0	150.0	178	450	※体伸、腰幅、尻幅、腹容、内腿、乳頭間隔	過大、肩端、肘後、後肢、骨太
149.8	+0.8	181.6	206	741	発育、資質、肋腹	均称、体上線、体下線、肩付、後軀
150.0	+0.8	182.0	204	680	体伸、体の品位、肩の厚さ、腰幅、腹容、内腿、皮のゆとり、乳頭、骨味	後肢、前背幅、胸深、毛色
159.0	+3.1	183.0	221	822	体積、体深、体伸、資質、骨味	過大、背幅、外腿、肋張
154.0	+1.8	177.0	215	763	体上線、資質、骨味、輪郭鮮明、側望均称	体積(幅)、後軀、肩端
154.8	+2.1	181.2	216	755	発育、体上線、内腿、毛味	体幅、肋張、肘後
151.0	+1.1	177.2	209	735	毛味、皮膚、腹容、骨味	肩後、肋張、肢勢
154.0	+1.8	175.4	208	703	体上線、腹容、輪郭鮮明、毛質	体深、肩後、肢勢、肘後
154.8	+2.1	183.6	215	751	体積、体深、体伸、体上線、腿、尻幅	肩端、ヤヤ肋張り、ヤヤ後肢
152.8	+1.7	178.0	205	650	腰幅、腹容、資質、骨味、顔品、後肢	肩後、肘後、外腿
153.4	+1.8	183.0	205	713	発育、体伸、腰幅、尻幅、資質、骨味、後肢	長脚、肘後、外腿
154.0	+2.1	177.6	218	794	発育、腰幅、資質、骨味、顔品	長脚、肋張り、下腿
154.6	+2.2	182.2	211	740	体積、体伸、皮膚、毛質、腹容、乳頭間隔	過大、下膝部、肘後、ヤヤ肩後
155.2	+2.5	177.0	220	762	体上線、皮膚、毛質、尻幅、腹容	過大、後肢、肩後、外腿、上肋の張り
150.0	+1.2	173.0	217	751	骨味、毛質、体深、腹容、皮膚のゆとり	尻、腿、体伸、前軀幅、背幅、肢勢
150.6	+1.4	171.6	205	691	体上線、輪郭鮮明、毛質、骨味、乳頭間隔	肩端、肘後、肩後、上肋の張り
146.2	+0.8	169.6	202	759	腹容、尻幅、資質、乳頭間隔、顔品	肩付、腿、後肢
136.4	+0.2	159.0	192	688	体深、後軀幅、皮膚のゆとり、乳微、内腿	上肩付着、肩後、下けん
136.6	+0.3	155.6	183	611	体上線、毛質、皮膚、骨味、体繋り	肋張、前肢つなぎ、外腿
141.2	+2.3	163.0	195	692	体伸、体上線、尻、皮膚、毛の密度	過大、長脚、背腰幅、外腿、乳頭の大きさ
127.4	-0.4	151.2	180	643	腰幅、腹容、体伸、腿の厚み、骨味、体上線、皮膚、乳頭間隔	尻の形、肩端、肘後、胸底
131.2	+1.4	150.6	178	635	発育、体伸、皮膚、尻幅、内腿、頭頸、乳頭間隔	肢勢、肩後、肘後、上肋、ヤヤ長脚
129.8	+0.7	144.0	173	533	骨味、輪郭鮮明、乳頭の大きさ、乳頭間隔、体上線、皮膚	肩後、肘後、背幅、尻の形、腿、ヤヤ長脚
136.0	+0.5	157.2	186	553	発育、体積、体伸、尻幅、毛味	上肩、肩後、後肢、肩端
136.0	+0.7	156.0	187	503	発育、腹容、肢勢、皮膚、毛味、乳頭間隔、骨味	肩端、上肋の張り、ヤヤ毛色
135.0	+0.8	147.4	182	438	※発育、体上線、毛質、骨味	尻、腿、下膝部、肩端
133.0	+0.9	143.8	173	410	※発育、骨味、毛質、輪郭鮮明、乳頭	背幅、長脚、外腿、尻形

※ 改良期待点・交配注意点は直接検定終了時

今後の予定表

登録日
子牛セリ市開催日

8月																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
西諸県			小林							山の日										多頭			児湯 都農 都	川南 城	西都	児湯	児湯			
																				北部支部・西部支部			三股		高崎	南支部・中央	東部支部			
																				都城宮崎	小林									

[illegible][illegible][illegible]